

Состав

Действующее вещество: цианамид;

Вспомогательные вещества: Сорбиновая кислота, Ледяная уксусная кислота, Натрия ацетат, Вода д/и.

Показания

Лечение хронического алкоголизма; профилактика рецидивов хронической алкогольной зависимости после лечения.

Противопоказания

Тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Заболевания дыхательной системы.

Заболевания почек, сопровождающиеся нарушением функции.

Тяжёлые заболевания печени.

Беременность.

Лактация (грудное вскармливание).

Повышенная чувствительность к препарату.

Побочные действия

Препарат, как правило, хорошо переносится, если пациент не употребляет алкоголь.

Иногда: чувство усталости, сонливость, кожная сыпь, шум в ушах, транзиторный лейкоцитоз.

Взаимодействие

Колме и другие ингибиторы альдегиддегидрогеназы. Одновременное применение Колме с метронидазолом, изониазидом, фенитоином и другими ингибиторами альдегиддегидрогеназы может усилить реакцию на употребление алкоголя (таких комбинаций следует избегать).

Колме и дисульфирам

Между применением дисульфирама и назначения Колме должен быть перерыв не менее 10 дней.

Колме и препараты альдегидной группы Колме не совместим с препаратами альдегидной группы (паральдегид и продукты хлорала).

Как принимать, курс приема и дозировка

Препарат назначают после тщательного обследования больного. Пациента необходимо предупредить о возможных осложнениях и последствиях проводимой терапии.

Препарат принимают внутрь по 36-75 мг (12-25 капель 2 раза/сут с интервалом между приемами 12 ч) по индивидуальной схеме.

Для дозирования следует вскрыть ампулу с раствором препарата и вылить содержимое ампулы во флакон, вложенный в упаковку. На флакон следует надеть капельницу. При хранении флакон необходимо плотно закрывать.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Возможно усиление побочных явлений.

Лечение: промывание желудка.

При необходимости проводят симптоматическую терапию, направленную на поддержание функции печени, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Контроль гематокрита и при необходимости – переливание крови.

Специальные указания

Применение при нарушениях функции печени: Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени.

Применение при нарушениях функции почек: Противопоказан при заболеваниях почек, сопровождающихся нарушением функции.

Особые указания: Препарат Колме должен применяться только под наблюдением врача и при согласии пациента на проводимую терапию. Следует иметь в виду возможность реакции на этанол, содержащийся в некоторых лекарственных средствах и пищевых продуктах. Лечение препаратом Колме следует начинать только по истечении 12 ч с момента последнего употребления алкоголя. С осторожностью применяют Колме в тех случаях, когда реакция пациента на одновременное употребление алкоголя может привести к риску для здоровья пациента: при гипертиреозе, сахарном диабете, эпилепсии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях почек. При длительном приеме препарата рекомендуется контролировать функцию щитовидной железы не реже одного раза в 6 мес.

Форма выпуска

Капли

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Возможно выпадение естественного осадка.

Срок годности

2 года

Действующее вещество

Цианамид

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Лекарственная форма

капли для приема внутрь